



2019~2020学年第一学期高一年级阶段性测评

数学试卷

(考试时间:上午 7:30——9:00)

说明:本试卷为闭卷笔答,答题时间90分钟,满分100分。

题号	一	二	三	总分
得分				

一、选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将其字母标号填入下表相应位置)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

1. 设集合 $A = \{-2, -1, 0, 1\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cup B =$

A. $\{0, 1\}$

B. $[0, 1]$

C. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

D. $[-2, 2]$

2. 函数 $f(x) = \sqrt{x-1} + \ln x$ 的定义域是

A. $(0, 1)$

B. $(0, +\infty)$

C. $[1, +\infty)$

D. $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

3. 下列函数中,是偶函数的为

A. $y = |x|$

B. $y = x^3$

C. $y = (\frac{1}{2})^x$

D. $y = \log_2 x$

4. 下列函数中,与 $f(x) = x$ 相等的函数是

A. $g(x) = \sqrt{x^2}$

B. $g(x) = \sqrt[3]{x^3}$

C. $g(x) = (\sqrt{x})^2$

D. $g(x) = \frac{x^2}{x}$





5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} \log_2 x, & x>0, \\ 2^x, & x\leq 0, \end{cases}$, 则 $f(-1)+f(1)=$

A. $\frac{1}{2}$

B. 0

C. -2

D. 2

6. 函数 $f(x)=a^{x-1}+1(a>0且a\neq 1)$ 的图象必经过的定点是

A. (1,1)

B. (0,2)

C. (-1,1)

D. (1,2)

7. 已知 $a=\log_{0.3}2, b=0.3^{0.2}, c=0.2^3$, 则下列结论正确的是

A. $a>b>c$ B. $b>c>a$ C. $c>a>b$ D. $b>a>c$

8. 已知点 (m,n) 在函数 $y=\lg x$ 的图象上, 则下列各点也在该函数的图象上的是

A. $(m^2, 2n)$ B. $(10m, 10n)$ C. $(m+10, n+1)$ D. $(\frac{m}{10}, n+1)$

9. 已知奇函数 $f(x)$ 在 R 上单调递增, 且 $f(-1)=-1$, 则不等式 $0<f(x)<1$ 的解集是

A. (0,1)

B. (-1,0)

C. (-1,1)

D. (-1, +∞)

10. 某校运动会上, 高一(1)班共有28名同学参加比赛, 其中有15人参加游泳比赛, 有8人参加田径比赛, 有14人参加球类比赛, 同时参加游泳比赛和田径比赛的有3人, 同时参加游泳比赛和球类比赛的有2人, 没有人同时参加三项比赛, 则同时参加田径比赛和球类比赛的人数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4





11. 设集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, a^2, -b^2\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a - b =$

- A. -2 B. 2
C. -2或2 D. 0

12. 已知 x_1, x_2 分别是方程 $2^x + x - a = 0$ 和 $\log_2 x + x - a = 0$ 的根, 且 $x_1 + x_2 = -1$, 则实数 $a =$

- A. -2 B. -1
C. 0 D. 2

二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分,把答案写在题中横线上)


13. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, 则 $\complement_U A =$ _____.

14. 已知幂函数 $f(x) = (m^2 - m - 1)x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 则 $f(2) =$ _____.

15. 已知 $x \log_2 2 = 1$, 则 $2^x + 2^{-x} =$ _____.

16. 已知定义在 \mathbb{R} 上的函数 $f(x)$ 满足: ①对于任意的 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x) + f(y) = f(x+y)$ 成立;

②当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$; ③ $f(3) = -1$; 则不等式 $\frac{1}{2} < f(x) < 2$ 的解集为 _____.



工大教育

—做最感动客户的专业教育组织





工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

查考试成绩、答案 | 查备课笔记
下载学习资料 | 及时获取最新教育信息

太原工大教育 官方微信号: tygdedu
官方网址: www.tygdedu.cn



三、解答题(本大题共5小题,共48分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)

17. 计算下列各式的值(每小题4分,共8分)

$$(1) 27^{\frac{1}{3}} - \sqrt{2}^0 - (\sqrt[3]{4})^{\frac{3}{2}};$$

$$(2) \log_2 \frac{4}{3} + \log_3 3 \cdot \log_6 6.$$

工大教育
—做最感动客户的专业教育组织





工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

查考试成绩、答案 | 查备课笔记
下载学习资料 | 及时获取最新教育信息

太原工大教育 官方微信号: tygdedu
官方网址: www.tygdedu.cn



18.(本小题10分)

已知全集 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid -2 < x < 0\}$, $B = \{x \mid m - 1 < x < 3 - m\}$.

(1) 当 $m = 0$ 时, 求 $A \cap B, A \cup B$:

(2) 若 $B \subseteq \complement_U A$, 求实数 m 的取值范围.



工大教育
—做最感动客户的专业教育组织





工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

查考试成绩、答案 | 查备课笔记
下载学习资料 | 及时获取最新教育信息

太原工大教育 官方微信号: tygdedu
官方网址: www.tygdedu.cn




19.(本小题10分)

$$\text{已知函数 } f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \leq 0, \\ 1 + \log_{\frac{1}{2}}x, & 0 < x \leq 1, \\ x^\alpha, & x > 1, \end{cases} \text{且 } f(4) = 2.$$

(1)求实数 α 的值,并在所给的平面直角坐标系中画出函数 $f(x)$ 的图象;

(2)根据 $f(x)$ 的图象写出 $f(x)$ 的单调区间,并求函数 $f(x)$ 的值域.



工大教育
—做最感动客户的专业教育组织





工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

查考试成绩、答案 | 查备课笔记
下载学习资料 | 及时获取最新教育信息

太原工大教育 官方微信号: tygdedu
官方网址: www.tygdedu.cn



20.(本小题10分)说明:请同学们在(A)、(B)两个小题中任选一题作答.

(A) 已知 $f(x) = \frac{ax^2 + b}{x}$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 且 $f(1) = 0, f(2) = \frac{3}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 判断函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性, 并证明你的判断.

(B) 已知 $f(x) = \frac{ax + b}{x^2 + 1}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 的定义域为 $(-1, 1)$, 且 $f(-1) = -\frac{1}{2}, f(0) = 0$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 判断函数 $f(x)$ 的单调性, 并证明你的判断.



工大教育
—做最感动客户的专业教育组织





工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

查考试成绩、答案 | 查备课笔记
下载学习资料 | 及时获取最新教育信息

太原工大教育 官方微信号: tygdedu
官方网址: www.tygdedu.cn



21.(本小题10分)说明:请同学们在(A)、(B)两个小题中任选一题作答.

(A)已知 $f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$,且 $f(1)=\frac{1}{3},a\in\mathbb{R}$.

(1)判断函数 $f(x)$ 的奇偶性,并说明理由;

(2)若 $-\frac{1}{3} < f(\log_2 m) < \frac{1}{3}$,求实数 m 的取值范围.

(B)已知 $f(x)=\log_2(\frac{2}{1+x}-a)$,且 $f(\frac{1}{3})=-1,a\in\mathbb{R}$.

(1)判断函数 $f(x)$ 的奇偶性,并说明理由;

(2)若 $-1 < f(3^n) < 1$,求实数 m 的取值范围.



工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

